**Naam kandidaat:** **Dienst of korps:**

**Evaluatieformulier reanimatie pediatrie (baby)**

| | Item | Handeling | Score 1 | | Score 2 | | Score 3 | | Score 4 | | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectieve proef | **Veiligheid** | De cursist toont/zegt dat hij/zij aan de veiligheid denkt. | -5 | ☐ | Proef zonder hulpmiddelen: De kandidaat dient het protocol volledig te doorlopen (dus 4 keer de sequentie 15:2). Indien de kandidaat de verhouding 30:2 hanteert kan dit als hij correct kan verklaren waarom hij dit doet (toegelaten in een setting waarbij de hulpverlener alleen is). Los van de reanimatie dient men een aantal ballonbeademingen te demonstreren en de techniek van borstcompressie met de 2-duimenmethode te demonstreren. | | | | | | versie 2012 |
| | **Bewustzijn** | Luid aanspreken<br>Zachtjes aan beide schouders schudden | -5 | ☐ | | | | | | | |
| | **Vrije luchtweg** | Hoofd in neutrale positie<br>Kinlift | -20 | ☐ | | | | | | | |
| | **Ademhaling** | Controle door te kijken, voelen en luisteren *<br>Gedurende maximaal 10 sec. * | -55 | ☐ | | | | | | | |
| | **Alarmering** | Bijstand MUG (ten vroegste na controle bewustzijn, ten laatste na controle ademhaling). | -20 | ☐ | | | | | | | |
| | **Start-beademingen** | Hoofd in neutrale positie en kinlift | -5 | ☐ | | | | | | | |
| | | Correcte duur (rustig, 1"), 5 beademingen in totaal. | -5 | ☐ | | | | | | | |
| | | Correct volume | -5 | ☐ | | | | | | | |
| | | Correcte mond-op-mondbeademing | -5 | ☐ | | | | | | | |
| | **Teken v leven** | Controle teken v leven (ademhaling, bewegen, hoesten), max 10 sec. | -10 | ☐ | | | | | | | |
| | **Borstcompressie** | Juiste plaatsing van de vingers **<br>Vingers worden niet verplaatst tijdens de borstcompressie **<br>Correcte houding | -15 | ☐ | -40 | ☐ | Sluiscriteria: 1ste fout = -15 2de fout = -40 (dus 2 fouten = -55) | | | | |
| | | Borstkas wordt voor 1/3 ingedrukt **<br>Borstkas voldoende laten ontspannen | -15 | ☐ | -40 | ☐ | | | | | |
| | | Frequentie min 100/min - max 120/min ** | -15 | ☐ | -40 | ☐ | | | | | |
| | **Beademen** | Hoofd in neutrale positie en kinlift | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | |
| | | Correcte duur (rustig, 1"/beademing, 5" totaal) | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | |
| | | Correct volume | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | |
| | | Correcte mond-op-mondbeademing | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | |
| | **Verloop** | Juiste volgorde | -20 | ☐ | | | | | | | |
| | | Reanimatie wordt niet onderbroken | -20 | ☐ | | | | | | | Evaluator 1 (naam + handtekening) |
| | | 15 hartmassages : 2 beademingen | -10 | ☐ | -10 | ☐ | -10 | ☐ | -10 | ☐ | |
| Demo achteraf | **Beademen: ballon alleen door H/A** | Hoofd in neutrale positie en kinlift | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | |
| | | Correcte plaatsing van het masker | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | |
| | | Correct volume | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | -5 | ☐ | |
| | | Correcte duur (rustig, 1"/beademing, 5" totaal) | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | -2,5 | ☐ | |
| | **Borstcompressie 2-duimen** | Juiste plaatsing van de vingers | -10 | ☐ | | | | | | | Evaluator 2 (naam + handtekening) |
| | | Vingers worden niet verplaatst tijdens de borstcompressie | -10 | ☐ | | | | | | | |
| | | Borstkas wordt voor 1/3 ingedrukt | -10 | ☐ | | | | | | | |
| | | Borstkas voldoende laten ontspannen | -10 | ☐ | | | | | | | |
| | | Frequentie min 100/min - max 120/min | -10 | ☐ | | | | | | | |
| | **Totaal:** | **/ 100** | **Geslaagd / Niet geslaagd** | | | | | | | | |

*** Sluiscriterium: Indien deze handeling foutief of niet wordt uitgevoerd, is de cursist NIET GESLAAGD.**

**** Sluiscriterium: Indien deze handeling <u>twee maal</u> foutief of niet wordt uitgevoerd, is de cursist NIET GESLAAGD.**